



**Universidad Nacional Mayor de San Marcos**

**Universidad del Perú. Decana de América**

**Facultad de Medicina**

**Unidad de Posgrado**

**Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana**

**“Factores de riesgo de disfunción eréctil en pacientes  
que acuden al consultorio de urología, Hospital Alberto  
Sabogal Sologuren periodo 2013-2014”**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

**Para optar el Título de Especialista en Urología**

**AUTOR**

**Giomar Elio FARFÁN DAZA**

**Lima, Perú**

**2014**

## **RESUMEN**

**INTRODUCCION** La disfunción eréctil es un problema de gran impacto que afecta 13 a 52% de varones, siendo los grupos más afectados entre 40 a 70 años. Esta condición sexual está motivada por problemas crónicos de salud como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, llamadas enfermedades de países en vías de desarrollo.

**OBJETIVO** Determinar los factores de riesgo de disfunción eréctil en los pacientes que acuden al consultorio de urología del Hospital Alberto Sabogal Sologuren periodo 2013–2014.

**OBJETIVOS ESPECIFICOS** Determinar si la edad, el síndrome metabólico, el consumo de sustancias, el síndrome de déficit de testosterona, la presencia de patología prostática, el tabaquismo, el antecedente de cirugía, el sedentarismo son factores de riesgo de disfunción eréctil.

**METODOLOGÍA** Se realizó el estudio analítico, transversal, observacional. A la información obtenida se le realizó el procesamiento estadístico en el programa SPSS (Versión 11.0).

**RESULTADOS** Los factores de riesgo de la disfunción eréctil fueron: edad de 60 a 70 años, presencia de Síndrome de déficit de testosterona, síndrome metabólico y el sedentarismo, mientras que la edad de 40 a 49 años fue un factor protector. Las patologías prostáticas no resultaron factores de riesgo en la disfunción eréctil. Además se encontró relación de la disfunción eréctil con el consumo de alcohol.

**PALABRAS CLAVES:** Disfunción erectil.

## **ABSTRACT**

**INTRODUCTION** Erectile dysfunction is a problem of great impact that affects 13-52% of men, the most affected groups between 40 to 70 years. This sexual condition is motivated by chronic health problems such as obesity, hypertension, diabetes called diseases of developing countries.

**OBJECTIVE** To determine the risk factors for erectile dysfunction in patients attending the urology clinic Sologuren Alberto Sabogal Hospital 2013-2014.

**SPECIFIC OBJECTIVES** To determine whether age, metabolic syndrome, substance abuse, syndrome, testosterone deficiency, the presence of prostate disease, smoking, history of surgery, physical inactivity are risk factors for erectile dysfunction.

**METHODOLOGY** analytical, cross-sectional, observational study. The information obtained underwent statistical processing in SPSS (version 11.0).

**RESULTS** Risk factors of erectile dysfunction were age 60 to 70 years, presence of testosterone deficiency syndrome, metabolic syndrome and physical inactivity, while the age of 40-49 years was a protective factor. The prostatic disease were not risk factors for erectile dysfunction. Furthermore ratio of erectile dysfunction with alcohol was found.

**KEYWORDS:** erectile dysfunction.